

OVERZICHT INFECTIEZIEKTEN VOOR SCHOLEN EN KINDERCENTRA



NB Alle overige ernstige aandoeningen van (vermoedelijk) infectieuze aard dienen ook aan ons gemeld te worden.

Ziekte/ Komt vooral voor bij leeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Wering van school/ kinderdag-verblijf nodig:	Contact GGD nodig:*
Bof (Alle leeftijden)	Koorts, opgezwollen/ pijnlijke wang(en), oorpijn.	5 dagen <i>vóór</i> tot 9 dagen <i>na</i> de zwelling van de wang(en).	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen.	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden bij 1 geval. Laagdrempelig contact met GGD bij vragen.
Diarree of Braken (Alle leeftijden)	Klachten van buikpijn, diarree, misselijkheid en/of braken.	Tijdens de klachten.	Ontlasting > Zeer alert zijn op goede hand- en toilethygiëne.	Geen	Mogen naar school of kindercentra. Wel strikte hygiëne handhaven.	Melden als meer dan 1/3 van de groep binnen een week klachten heeft.
Hand- voet- mondziekte (1 – 5 jaar)	Pijnlijke blaasjes in de mond, op de handpalmen en voetzolen.	3 tot 7 dagen <i>vóór</i> het ontstaan van de klachten tot nog tijdelijk <i>na</i> herstel.	Hoesten, niezen, contact met het vocht uit de blaasjes en via ontlasting > Alert zijn op hoest-, hand- en toilethygiëne en het schoonhouden van speelgoed.	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Hepatitis A (Alle leeftijden)	Verloopt vaak onopgemerkt bij kinderen. Koorts, buikklachten, misselijkheid, geelzucht, donkere urine, vermoeidheid.	Ongeveer 1 week <i>vóór</i> tot ongeveer 1 week <i>na</i> het ontstaan van de geelzucht of koorts.	Ontlasting > Goed op hygiëne bij verschonen letten. Handhygiëne na toiletgang is erg belangrijk.	Geen	Schoolkinderen weren tot 1 week na het ontstaan van de geelzucht. Overige kinderen niet zinvol, behalve als een kind terug komt van vakantie en nog niet op het verblijf is geweest.	Melden bij de GGD als iemand verschijnselen van hepatitis A heeft (Ook geelzucht direct melden).
Kinkhoest (Alle leeftijden)	Begint met verkoudheid, droge hoest. Later flinke hoestbuien. Hoestklachten houden lang aan.	4 weken vanaf de eerste klachten.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van kinderen < 1 jaar.	Overleg met GGD of huisarts als >36 weken zwanger en er contact is geweest met iemand met kinkhoest.	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden bij 1 geval. Laagdrempelig contact met GGD bij vragen.
Krentenbaard (impetigo) (<3 jaar)	Bultjes die vaak beginnen in het gezicht. De bultjes worden blaasjes, gevuld met vocht.	Voor en tijdens het ontstaan van de blaasjes. Niet meer besmettelijk 48 uur na beginnen antibiotica of als de blaasjes zijn Ingedroogd.	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoonhouden van speelgoed.	Rondom de bevalling contact vermijden met iemand met krentenbaard.	Mogen naar school of kindercentra. Wel blaasjes eventueel afplak-ken of starten met antibiotica (ouders adviseren naar de huisarts te gaan).	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.

Ziekte/ Komt vooral voor bij leeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Wering van school/ kinderdag-verblijf nodig:	Contact GGD nodig:*
Mazelen (½ – 10 jaar)	Hoge koorts, verkoudheid, rode ogen, rode vlekjes beginnend achter oor en vervolgens over hele lichaam.	4 dagen <i>vóór</i> het ontstaan van de klachten tot 4 dagen <i>na</i> het begin van de vlekjes.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne de vaccinatiestatus van de kinderen.	Indien niet gevaccineerd of nooit doorgemaakt: contact met mazelen patiënten vermijden.	Niet zinvol, besmetting heeft zeer waarschijnlijk al plaats gevonden.	Melden bij de GGD indien iemand verschijnselen van mazelen heeft.
Rodehond (rubella) (5 – 20 jaar)	Verkoudheid, rode vlekjes beginnend in het gezicht en vervolgens over hele lichaam, kan egaal rood/ roze worden.	10 dagen <i>vóór</i> tot 7 dagen <i>na</i> het ontstaan van de rode vlekjes.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne de vaccinatiestatus van de kinderen.	Indien niet gevaccineerd of het niet doorgemaakt: contact met rodehond patiënten vermijden.	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Roodvonk (<6 jaar)	Koorts, felrode vlekjes die eruit zien als kippenvel en voelen als schuurpapier, 'frambozentong', later vervelling van de huid.	Al voor het ontstaan van de vlekjes, tot de vervelling voorbij is. Bij behandeling tot 48 uur na starten hiervan.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Contact rondom de bevalling vermijden met iemand met roodvonk.	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 ofmeer zieken zijn in dezelfde groep
Schurft (scabiës) (Alle leeftijden)	Toenemende jeuk, vooral 's nachts. Op de huid mogelijk rode bultjes en blaasjes.	Zolang de mijten aanwezig zijn. 12- 24 uur na behandeling afhankelijk van type behandeling	Minimaal 15 minuten of regelmatig intensief lichamelijk contact of via besmette lakens.	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden bij 1 of meer gevallen.
Vijfde ziekte (4 – 10 jaar)	Vlindervormige vlekjes beginnend in het gezicht, vuurrodewangen. Vervolgens verspreiding over het hele lichaam Mogelijk met koorts, jeuk.	1 week voordat de vlekjes ontstaan. Bij het ontstaan van de vlekjes is er géén gevaar meer op besmetting .	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Contact met huisarts of GGD opnemen als een zwangere <20 weken zwanger is en de ziekte nooit heeft gehad of dit onbekend is.	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 ofmeer zieken zijn in dezelfde groep
Waterpokken (2 – 6 jaar)	Kleine rode bultjes waarop later blaasjes ontstaan met veel jeuk.	2 dagen <i>vóór</i> tot max. 7 dagen na ontstaan blaasjes. Als de blaasjes zijn ingedroogd is het niet meer besmettelijk.	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoonhouden van speelgoed.	Indien de ziekte niet doorgemaakt: contact met besmette personen vermijden. Bij wel contact: GGD of huisarts raadplegen.	Niet zinvol, besmetting heeft zeer waarschijnlijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 ofmeer zieken zijn in dezelfde groep.
Zesde ziekte (½ – 3 jaar)	Koorts, gevolgd door een niet jeukende huiduitslag beginnend in het gezicht, daarna romp, armen, nek.	Tijdens de koorts en huiduitslag totdat dit verdwenen is.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Geen	Niet zinvol, besmetting heeft mogelijk al plaats gevonden.	Melden als er binnen 2 weken 2 ofmeer zieken zijn in dezelfde groep.