

OVERZICHT INFECTIEZIEKTEN VOOR SCHOLEN EN KINDERCENTRA



NB Alle overige ernstige aandoeningen van (vermoedelijk) infectieuze aard dienen ook aan ons gemeld te worden.

De afdeling infectieziektebestrijding van de GGD is bereikbaar op 0113-249489 of infectieziekten@ggdzeeland.nl, laagdrempelig contact bij vragen of onrust.

Ziekte/ Komt vooral voor bij leeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Contact GGD nodig:*
Bof	Koorts, opgezwollen/ pijnlijke wang(en), Spierpijn, hoofdpijn.	2 dagen <i>vóór</i> tot 5 dagen <i>na</i> de zwelling van de wang(en).	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen.	Geen	Melden bij 1 geval. Laagdrempelig contact met GGD bij vragen.
Diarree of Braken	Klachten van buikpijn, diarree, misselijkheid en/of braken.	Tijdens de klachten.	Ontlasting > Zeer alert zijn op goede hand- en toilethygiëne.	Geen	Melden als meer dan 1/3 van de groep binnen een week klachten heeft.
Hand- voet- mondziekte	Pijnlijke blaasjes in en rond de mond, op de handpalmen en voetzolen.	3 tot 7 dagen <i>vóór</i> het ontstaan van de klachten tot tijdelijk <i>na</i> herstel.	Hoesten, niezen, contact met het vocht uit de blaasjes en via ontlasting > Alert zijn op hoest-, hand- en toilethygiëne en het schoonhouden van speelgoed.	Geen	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Hepatitis A	Verloopt vaak onopgemerkt bij kinderen onder de vijf jaar. Koorts, buikklachten, geelzucht, donkere urine.	1 week <i>vóór</i> tot 1 week <i>na</i> het ontstaan van de geelzucht of koorts.	Ontlasting > Goed op hygiëne bij verschonen letten. Handhygiëne na toiletgang is erg belangrijk.	Geen	Melden bij 1 geval. Geelzucht = melden.
Kinkhoest	Begint met neusverkoudheid. Na 1-2 weken hoestbuien. Hoestklachten houden lang aan.	Vanaf het begin van de verkoudheid tot 3 weken na het begin van de hoestbuien.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus.	Overleg met GGD of huisarts als de zwangere >34 weken is en er contact is geweest met iemand met kinkhoest.	Melden bij 1 geval. Laagdrempelig contact met GGD bij vragen.
Krentenbaard (impetigo)	Bultjes die overgaan in blaasjes en uiteindelijk in geelbruine korsten. Voorkeuslocatie in het gezicht.	Een aantal dagen voor het ontstaan van de blaasjes. Niet meer besmettelijk als de blaasjes zijn Ingedroogd en/of 2 dagen na het begin van een behandeling.	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoonhouden van speelgoed.	Zwangeren in het laatste trimester en kraamvrouwen moeten contact vermijden met iemand met krentenbaard.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.

Ziekte/ Komt vooral voor bij leeftijd:	Kun je herkennen aan:	Is besmettelijk in de periode:	Hoe wordt het overgedragen en hoe voorkom je verspreiding:	Maatregelen voor zwangere vrouwen:	Contact GGD nodig:*
Mazelen	Hoge koorts, verkoudheid, rode ogen, rode vlekjes beginnend achter oor en vervolgens over hele lichaam.	4 dagen <i>vóór</i> tot en met 4 dagen <i>na</i> het begin van de vlekjes.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus.	Indien niet gevaccineerd of nooit doorgemaakt: contact met mazelen patiënten vermijden.	Melden bij de GGD indien iemand verschijnselen van mazelen heeft.
Rodehond (rubella)	Koorts, gevoelige opgezette lymfeklieren achter het oor en de nek, roze/rode vlekjes beginnend in het gezicht en vervolgens over hele lichaam.	10 dagen <i>vóór</i> tot 7 dagen <i>na</i> het ontstaan van de vlekjes.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en de vaccinatiestatus van de kinderen.	Indien niet gevaccineerd contact met rodehond patiënten vermijden.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Roodvonk	Koorts, braken, hoofdpijn, keelpijn. Gevolgd door felrode vlekjes die eruit zien als kippenvel en voelen als schuurpapier, 'frambozentong'. Later vervelling van de huid.	Vanaf het begin van de klachten tot na het vervellen van de huid.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Zwangeren in het laatste trimester en kraamvrouwen contact vermijden met iemand met roodvonk.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Schurft (scabiës)	Jeuk. Op de huid mogelijk rode bultjes en blaasjes. Zichtbare 'gangetjes' op de huid.	Vanaf het moment dat de mijten op de huid zitten, tot 12 uur na de start van de eerste behandeling.	Langdurig (15 minuten of langer) of regelmatig direct huid-huidcontact. Gezamenlijk gebruik van bed, kleding, etc.	Geen	1 of meer gevallen met de diagnose of verdenking.
Vijfde ziekte	Koorts, vliedervormige vlekjes beginnend in het gezicht, vuurrode wangen, gewrichtsklachten.	1 week na besmetting tot begin van de huiduitslag.	Hoesten en niezen > Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Zwangeren <20 weken contact vermijden met iemand met de vijfde ziekte.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Waterpokken	Koorts, hangerigheid, vlekjes beginnen op hoofd/romp en groeien tot bultjes en blaasjes.	2 dagen <i>vóór</i> het ontstaan van de huiduitslag tot het indrogen van de blaasjes.	Hoesten, niezen en contact met het vocht uit de blaasjes > Alert zijn op hoest- en handhygiëne en het schoon houden van speelgoed.	Indien de ziekte niet doorgemaakt: contact vermijden met iemand met de waterpokken.	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.
Zesde ziekte	Koorts, gevolgd door huiduitslag beginnend in het gezicht, daarna romp, armen, nek.	Onbekend.	Via speeksel. Alert zijn op hoest- en handhygiëne.	Geen	Melden als er binnen 2 weken 2 of meer zieken zijn in dezelfde groep.